




Responsabile Dottor Filippo Nigro

**Medico Chirurgo
Specialista in Urologia
Dirigente Medico I livello
presso U.O.C. Urologia
Ospedale San Bortolo -
AULSS8 Berica, Vicenza.**

**Alta Specializzazione
Endoscopia / Endourologia**

**Per maggiori informazioni visita il
nostro sito www.hubsalute.it oppure
scrivi a: echolaser@hubsalute.it**

**Perche' scegliere
EchoLaser SoracteLite TPLA per il
trattamento della
Ipertrofia Prostatica Benigna?**

- **Riduzione del volume prostatico e beneficio minzionale globale**
- **Alternativa alla terapia farmacologica**
- **Procedura ambulatoriale (senza ospedalizzazione)**
- **L'unico trattamento con accesso transperineale (uretra non violata)**
- **Preservazione della funzionalita' erettile e dell'eiaculazione anterograda**
- **Nessun impatto sulla continenza urinaria**

+HUB
HEALTH UNIT BIO

**ECHO-LASER
SORACTE LITE**

**LASER NON CHIRURGICO
PER L'IPERTROFIA
PROSTATICA BENIGNA**

Responsabile Dottor Filippo Nigro


COS'È L'IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA?

L'Ipertrofia Prostatica Benigna è un ingrossamento della ghiandola prostatica, generalmente nella zona centrale, che porta ad un restringimento del canale uretrale. Questo comporta una progressiva difficoltà allo svuotamento vescicale.

Questa patologia tende a svilupparsi con il naturale avanzamento dell'età. A partire dai 50 anni si osserva un'incidenza crescente, risultando una delle patologie più comuni tra gli uomini.

SINTOMATOLOGIA

- Difficoltà nella minzione e debole flusso di urina
- Sensazione di mancato svuotamento vescicale
- Bisogno di urinare frequentemente e con urgenza
- Nicturia (necessità di urinare di notte)



COS'È SORACTELITE TPLA?

EchoLaser è una procedura non chirurgica micro-invasiva che, mediante l'erogazione di energia laser, comporta una sensibile riduzione del volume prostatico consentendo la risoluzione dei sintomi minzionali compressivi ed irritativi.

EchoLaser utilizza energia laser a bassa potenza per alcuni minuti: la radiazione laser viene trasmessa per mezzo di fibre ottiche posizionate nella ghiandola prostatica per via percutanea, in anestesia locale. La porzione di tessuto termicamente trattata viene riassorbita in modo naturale dalla ghiandola nelle settimane successive con conseguente miglioramento del pattern minzionale.